



PROTOCOLE POUR UNE RÉANIMATION NÉONATALE EFFICACE

BÉBÉ QUI NE RESPIRE PAS/CHERCHE DE L'AIR/NE PLEURE PAS :

Séchez et stimulez le bébé avec un tissu pendant 10 secondes au maximum.

Si le bébé respire, remettez-le à sa mère, observez-le attentivement et procédez comme d'habitude.

LE BÉBÉ NE RESPIRE PAS :

Commencez la ventilation à l'aide d'un insufflateur BVM.



- A** – **Aligner la tête**
(légèrement en arrière)
- I** – **Installer le masque sur le nez et la bouche**
(pas sur les yeux)
- D** – **Diriger la mâchoire** (entrouvrir les os des mâchoires pour ouvrir les voies respiratoires)
- E** – **Effectuer une insufflation douce** (petite pression pour que la poitrine monte, mais sans se gonfler)
- R** – **Rythme \approx 1 s entre chaque insufflation**
(40 à 60 pressions/min)

Si le bébé respire, donnez-le à sa mère et surveillez-le de très près.

LE BÉBÉ NE RESPIRE PAS :

Si le bébé ne respire pas après 5 pressions, ou s'il n'y a pas de mouvement de la poitrine, utilisez une poire d'aspiration pour éliminer les sécrétions, le méconium ou le sang. Aspirez la bouche avant le nez.

Continuez la ventilation à l'aide du BVM.

Mesurez la fréquence cardiaque, et si possible, fixez un oxymètre de pouls.

Commencez les compressions thoraciques si la fréquence cardiaque est inférieure à 60 battements par minute.

LA MINUTE D'OR